

TÉTINE & ALLAITEMENT MATERNEL



LA CONFUSION SEIN TÉTINE EXISTE-T-ELLE VRAIMENT ?

Les mécanismes de succion sont différents entre le sein et la tétine.


Si la succion de votre bébé n'est pas encore bien intégrée, il est possible que celui-ci ne sache plus téter et exprimer le lait correctement.

Avec l'utilisation de la tétine, les tétées pourraient se faire moins nombreuses, donc impacter votre lactation (montée laiteuse durant le séjour à la maternité ou baisser votre lactation à la maison).

Le bébé peut se rendormir sur la tétine au lieu de téter et vous pouvez passer à côté d'une tétée nutritive, il en est de même pour un allaitement artificiel.

N'hésitez pas à poser toutes vos questions aux équipes de maternité
qui sont présentes pour vous accompagner.

À éviter



PRECAUTIONS :

- Attendre que l'allaitement soit bien démarré avant d'introduire une tétine (soit environ 4 à 6 semaines).
- Qu'elle ne serve pas de « bouchon ».
- Enlever la tétine dès que votre bébé s'est endormi.
- Attention au marketing, AUCUNE tétine n'est physiologique.

AUTRES TECHNIQUES POUR APAISER BEBE :

- Le portage ;
- Le peau à peau ;
- La promenade (poussette ou écharpe).